睡眠時無呼吸症候群 専門外来のご案内

每週月•火曜日•水曜日14:00-16:00

内科 予約制 担当 江田(月・火)、近藤(水)

睡眠中に断続的に無呼吸を繰返し、日中頃眠などの種々の症状を呈する疾患で、交通事故など社会問題となっています。早期発見のため、ご利用ください。

定義: <u>睡眠一時間あたりの無呼吸・低呼吸(AHI)が5回以上起こる。</u>で診断します<u>。</u> 無呼吸: 10 秒以上の呼吸停止、低呼吸: 1回換気量が覚醒安静時の50%以下。 【無呼吸低呼吸指数 AHI】:睡眠1時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数







問診


日中の眠気の程度、いびき、耳鼻科的疾患等の合併症、生活習慣などに関して問診を行います。Epworth の眠気テスト(ESS)を用います。

<<Epworth の眠気テスト(ESS)>>


状況	点数
 座って読書しているとき テレビを見ているとき 公の場所で座って何もしないとき(たとえば劇場や会議) 1時間続けて車に乗せてもらっているとき 状況が許せば、午後横になって休息するとき 座って誰かと話をしているとき 昼食後(お酒を飲まずに)静かに座っているとき 車中で、交通渋滞で2~3分止まっているとき 	0 1 2 3 0 1 2 3

O:眠くならない。 1:まれに眠くなる。 2:しばしば眠くなる。 3:よく眠くなる。 合計 10点以上は疑いが強い… 検査を受けてみてはいかがでしょう。

睡眠時無呼吸症候群の診断



治療: 鼻マスク持続陽圧換気療法 (AHI≥20で保険適用)



月に1回 チップ持参

● 無呼吸を治療して元気になりましょう。

*日中の眠気がなくなった*熟睡感がある*目覚めがよい* 何年かぶりに頭がスッキリとした*頭のなかにそよ風が吹いているように爽快感がある*胸に新鮮な空気で満たされたようだ*夜間の排尿回数が減った。

倉敷市立市民病院